



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ IASP & EFIC

Υπό την Αιγίδα



16^η

**ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ**

Αλγολογίας

Καρκινικός Πόνος

31 Μαΐου & 1 Ιουνίου 2025

Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού

ΤΗΝΟΣ

www.algologymeeting.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



myrtaly
congress

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (PCO): MYRTALY CONGRESS IKE

Πλ. Νεομάρτυρος Ιωάννου 2, Ιωάννινα, ΤΚ: 452 21, Τ: 26510 73519, Ε: info@myrtalycongress.gr, W: <https://myrtalycongress.gr>



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ IASP & EFIC

Υπό την Αιγίδα



ΟΡΓΑΝΩΣΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ IASP & EFIC



HELLENIC SOCIETY OF ALGOLOGY
GREEK CHAPTER OF IASP & EFIC

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ

Μακρυνίτσας 4 - 6, Αθήνα 115 22

Τηλ: 210 6421700 (Δευτέρα-Πέμπτη 5-8 μ.μ.)

Fax: 210 6448686

Email: info@algologia.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΕΑ 2023 – 2026

ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Χρονά Ελένη
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Κολοτούρα Αθηνά
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Τσιρογιάννη Αικατερίνη
ΤΑΜΙΑΣ	Αρναούτογλου Ελένη
ΜΕΛΗ	Κετικίδου Ευγενία Νύκταρη Βασιλεία Πουλοπούλου Σοφία
ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΗ	Βαρβέρη Μαριάνθη Μπαρέκα Μεταξά
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ EFIC	Βαγδατλή Κυριακή

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
Τσιρογιάννη Αικατερίνη

16^η

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Αλγολογίας

Καρκινικός Πόνος

31 Μαΐου & 1 Ιουνίου 2025

Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού

ΤΗΝΟΣ



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ - ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Πιστοί στο ραντεβού για την ετήσια επιστημονική μας εκδήλωση, η Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας σας προσκαλούν στη **16^η Επιστημονική Συνάντηση Αλγολογίας**, με θέμα «**Καρκινικός Πόνος**» που διοργανώνει στις **31 Μαΐου & 1 η Ιουνίου 2025**, στο νησί της πίστης και της τέχνης, το γοττευτικό νησί της Τήνου.

Σημείο συνάντησής μας το Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, ένα νεοκλασικό μέγαρο το οποίο δεσπόζει στο λιμάνι της Χώρας της Τήνου, εκεί που η ατμόσφαιρα αποπνέει τέχνη, πολιτισμό, ιστορία και παράδοση. Θα αποχαιρετήσουμε την άνοιξη και θα υποδεχθούμε το καλοκαίρι, έχοντας τη δυνατότητα να ακούσουμε τους ομιλητές, να συζητήσουμε προβληματισμούς, να ανταλλάξουμε εμπειρίες και απόψεις πάνω στο θέμα του «Καρκινικού Πόνου», ένα πρόβλημα που αφορά διαχρονικά όλα τα Ιατρεία Πόνου.

Αικατερίνη Τσιρογιάννη

**Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
της Επιστημονικής Συνάντησης**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ IASP & EFIC

Υπό την Αιγίδα



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

- Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, Τήνος
Διεύθυνση: Ακτή Γ. Δρόσου, 84200, Τήνος, Τηλ: +30 2283029070
- 31 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2025

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

<https://algologymeeting.gr>

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Εγγραφές πραγματοποιούνται:

- διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο:
<https://www.e-myrtaly.gr/gr/algologymeeting2025>
- δια ζώσης στη Γραμματεία της Επιστημονικής εκδήλωσης,
κατά τη διάρκεια των εργασιών

ΓΛΩΣΣΑ

Επίσημη γλώσσα της Επιστημονικής συνάντησης είναι η Ελληνική.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η παρακολούθηση της Επιστημονικής συνάντησης είναι για όλους τους συμμετέχοντες δωρεάν.

ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS – EACCME θα χορηγηθούν 6 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits), από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Όλοι οι εγγεγραμμένοι δικαιούνται σύμφωνα με τη διάταξη του ΕΟΦ (81867/19- 11-2012) Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, εφ' όσον έχουν συμπληρώσει το 60% των συνολικών ωρών παρακολούθησης της Επιστημονικής συνάντησης και έχουν συμπληρώσει το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα εκδίδεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα e-myrtaly (www.e-myrtaly.gr) μετά το πέρας των εργασιών της Επιστημονικής Συνάντησης.

Ο αριθμός Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD), θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης.

16^η

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Αλγολογίας

Καρκινικός Πόνος

31 Μαΐου & 1 Ιουνίου 2025

Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού

ΤΗΝΟΣ



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

BADGES

Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι παραλαμβάνουν από την Γραμματεία της Επιστημονικής Συνάντησης μέσω e-mail την ονομαστική τους κονκάρδα που φέρει μοναδικό γραμμικό κώδικα (barcode). Οι ονομαστικές κονκάρδες σαρώνονται κατά την είσοδο και την έξοδο από την αίθουσα προκειμένου να καταγράφονται οι συνολικές ώρες παρακολούθησης της Επιστημονικής εκδήλωσης.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Η Οργανωτική Επιτροπή και η Γραμματεία της Επιστημονικής Συνάντησης δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή απώλεια, φθορά, κλοπή ή ζημιά προσωπικών αντικειμένων των συμμετεχόντων.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ

Στο συνεδριακό χώρο θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια της Επιστημονικής Συνάντησης η γραμματεία της ΕΕΑ για εγγραφές και ανανεώσεις συνδρομών των μελών.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ



ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (PCO):

MYRTALY CONGRESS IKE

Πλ. Νεομάρτυρος Ιωάννου 2,

Ιωάννινα, ΤΚ: 452 21

T: 26510 73519

E: info@myrtalycongress.gr

W: www.myrtalycongress.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ IASP & EFIC

Υπό την Αιγίδα



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο, 31 Μαΐου 2025

11:30 - 12:00 Προσέλευση - Εγγραφές

12:00 - 13:00 Καρκίνος: Ένα όνομα που «πονάει», πολλά πρόσωπα

Προεδρείο: **Τσιρογιάννη Αικατερίνη, Χρονά Ελένη, Φιλόπουλος Ευάγγελος**

12:00 - 12:20 Το μέγεθος του προβλήματος: επιδημιολογικά στοιχεία καρκίνου - καρκινικού πόνου
Τσουμάνη Μαρία

12:20 - 12:40 Βιολογικοί μηχανισμοί του καρκίνου: Ασθένεια του σύγχρονου τρόπου ζωής - Προλαμβάνοντας τον πόνο
Μίχα Γεωργία

12:40 - 13:00 Γιατί πονάει ο ασθενής με καρκίνο; Από το χειρουργείο ως την παρηγορική φροντίδα
Μπαρέκα Μεταξία

13:00 - 14:00 Καρκινικός πόνος - εκτιμώντας το πρόβλημα

Προεδρείο: **Κετικίδου Ευγενία, Βαλσαμίδης Δημήτριος, Μαντουβάλου Μαρία**

13:00 - 13:20 Εκτίμηση και αξιολόγηση του πόνου – Αρκούν οι κλίμακες πόνου;
Βαρβέρη Μαριάνθη

13:20 - 13:40 Ανεκπλήρωτες ανάγκες και έλλειμμα ιατρικής ενημέρωσης επιβαρύνουν τον πόνο;
Νύκταρη Βασιλεία

13:40 - 14:00 Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του καρκίνου στους επιβιώσαντες που σχετίζονται με τον πόνο
Αποστολάκη Στυλιανή

14:00 - 14:30 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

βλ. σελίδα 14

14:30 - 15:00 Διάλειμμα / Ελαφρύ γεύμα



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο, 31 Μαΐου 2025

15:00 - 16:00 Καρκινικός πόνος. Και τώρα τι κάνω;

Προεδρείο: Κολοτούρα Αθηνά, Κουρούκλη Ειρήνη,
Σταυροπούλου Ευμορφία

15:00 - 15:15 Φαρμακολογικές Θεραπείες στη διαχείριση του πόνου
Νταλούκα Μαρία

15:15 - 15:30 Επεμβατικές Θεραπείες στη διαχείριση του πόνου
Τσαρουχά Αθανασία

15:30 - 15:45 Συμπληρωματικές/Εναλλακτικές Θεραπείες
Μπουζιά Αικατερίνη

15:45 - 16:00 Ρόλος της άσκησης και διατροφής στην ύφεση του πόνου
Χλωροπούλου Παναγιώτα

16:00 - 17:00 «Ενός κακού μύρια έπονται» - Αυτά που κάνουν τη ζωή δύσκολη!

Προεδρείο: Αρναούτογλου Ελένη, Αμανίτη Αικατερίνη,
Αντωνοπούλου Ελπίδα

16:00 - 16:20 Δυσκοιλιότητα, ναυτία και έμετος, μυϊκή αδυναμία,
διαταραχές ύπνου - Οι μη επώδυνες, αλλά βασανιστικές
επιπλοκές
Διαμαντάκη Ελένη

16:20 - 16:40 Ισότιμη πρόσβαση στα αναλγητικά.
Μύθος ή πραγματικότητα;
Στεφανάκης Γεώργιος

16:40 - 17:00 Καρκινικός πόνος και ψυχική υγεία: Καιρός για ενσωμάτωση
και κάλεσμα για δράση
Σιαφάκα Βασιλική

17:00 - 17:30 Διάλειμμα / Καφές



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ IASP & EFIC

Υπό την Αιγίδα



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο, 31 Μαΐου 2025

17:30 - 18:30 Καρκινικός πόνος: μια δυνατή δοκιμασία – πρόκληση για ασθενή και φροντιστή

Προεδρείο: **Βαγδατλή Κυριακή, Μπαϊρακτάρη Αγγελική, Γαρίνη Ελεάνα**

17:30 - 17:50 Το βίωμα του καρκινικού πόνου από την πλευρά του ασθενή και του φροντιστή
Μάλλιου Χρυσάνθη

17:50 - 18:10 Ιδιαιτερότητες στη διαχείριση του καρκινικού πόνου παιδιών και εφήβων. Εστιάζοντας στην οικογένεια
Βεκράκου Άρτεμις

18:10 - 18:30 Η σύγχρονη τεχνολογία στην υποστήριξη του ογκολογικού ασθενούς
Καρακώστα Αγάθη

Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025

09:30 - 10:30 Το δικαίωμα στην παρηγορική φροντίδα

Προεδρείο: **Σιαφάκα Ιωάννα, Ανίσσογλου Σουζάνα, Κοκολάκη Μαρία**

09:30 - 09:45 Κατανόηση της Διαδοχικής / Παρηγορικής φροντίδας ως το τέλος της ζωής
Παπαγεωργίου Ειρήνη

09:45 - 10:00 Ηθικά διλήμματα στο τέλος της ζωής
Χλωροπούλου Πελαγία

10:00 - 10:15 Προβλήματα στη διαχείριση ασθενών σε απομακρυσμένες περιοχές
Μπαρκούρη Θεοδώρα

10:15 - 10:30 Διασύνδεση και λύσεις στα προβλήματα των Ιατρείων Πόνου απομακρυσμένων περιοχών
Σιαφάκα Ιωάννα



Το φάρμακο επιλογής για ασθενείς με νευροπαθητικό πόνο^{1,4,10}

Συνιστάται ως θεραπεία πρώτης γραμμής για τον νευροπαθητικό πόνο από τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες^{1,4}

Αποτελεσματική και γρήγορη ανακούφιση του πόνου σε ασθενείς με:

- Επώδυνη διαβητική περιφερική νευροπάθεια⁵
- Οσφυαλγία με νευροπαθητικά στοιχεία πόνου⁶
- Μεθερπητική νευραλγία⁷
- Τραυματισμό νωτιαίου μυελού⁸

Σημαντική βελτίωση της διαταραχής του ύπνου που σχετίζεται με τον νευροπαθητικό πόνο⁹

Ταχεία ανακούφιση των συμπτωμάτων άγχους⁹

Χαμηλή πιθανότητα φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων¹⁰

Οι ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται σε χαμηλότερες δόσεις Lyrica, μπορούν να ωφεληθούν από την αύξηση της δόσολογίας. Συνιστάται στους γιατρούς να ακολουθούν τις οδηγίες θεραπείας και να πραγματοποιούν αυξήσεις στη δόση, που παρέχει τη βέλτιστη αναλγησία με χαμηλό ποσοστό ΑΕ.^{10,11}

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ¹²:

Το Lyrica αντενδείκνυται σε ασθενείς με υπερευαισθησία στη δραστική ουσία πρεγκαμπαλίνη ή σε κάποιο από τα έκδοχα του φαρμάκου. Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ζάλη και υπνηλία. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν συνήθως ήπιες έως μέτριες βαρύτητας. Από την αποκήρυξη εμπειρία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου στην αγορά έχουν υπάρξει αναφορές ανεπιθύμητων υπεραισθησιακών συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων αγγειοσπασμού. Η θεραπεία με πρεγκαμπαλίνη έχει συσχετιστεί με ζάλη και υπνηλία, που μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα τραυματισμού από ατύχημα (πέσιμο) στους ηλικιωμένους. Έχουν υπάρξει επίσης αναφορές απώλειας συνείδησης, σύγχυσης και επηρεασμένης διανοητικής κατάστασης μετά την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά. Έχουν αναφερθεί επίσης οπτικές ανεπιθύμητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας όρασης, του θάμβους όρασης ή άλλων μεταβολών της οπτικής όρασης. Στη θεραπεία του νευροπαθητικού πόνου εξαιτίας βλάβης του νωτιαίου μυελού είχε αναφερθεί γενικός ή συχνότερη εμφάνιση των ανεπιθύμητων ενεργειών και μπορεί να αποδοθεί σε μία αθροιστική δράση εξαιτίας των συγχρησιμοποιούμενων φαρμακευτικών προϊόντων (π.χ. φάρμακα κατά της σπαστικής). Κατά τη διάρκεια θεραπείας με πρεγκαμπαλίνη για μία από τις νευροπαθητικές της ενδείξεις, έχουν υπάρξει αναφορές συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας, κυρίως σε ηλικιωμένους ασθενείς με καρδιαγγειακά προβλήματα. Οι ασθενείς με μειωμένη αναπνευστική λειτουργία, αναπνευστική ή νευρολογική νόσο, νεφρική δυσλειτουργία, ταυτόχρονη χρήση κατασταλτικού του ΚΝΕ και οι ηλικιωμένοι, μπορεί να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να παρουσιάσουν αναπνευστική καταστολή βαριάς μορφής. Αυτοκτονικές ιδέασες και αυτοκτονική συμπεριφορά έχουν αναφερθεί σε ασθενείς υπό αγωγή με αντιεπιληπτικά φάρμακα για διάφορες ενδείξεις. Μετά από διακοπή βραχυπρόθεσμα και μακροχρόνιας θεραπείας με πρεγκαμπαλίνη, έχουν παρατηρηθεί στερεοτικά συμπτώματα σε μερικούς ασθενείς, όπως απώλεια, κεφαλαλγία, ναυτία, άγχος, διάρροια, γριππώδες σύνδρομο, νευρική κόπωση, κατάθλιψη, άγχος, σπασμοί (συμπεριλαμβανομένου του Status Epilepticus) υπερδιούρση και ζάλη, τα οποία υποδηλώνουν σωματική εξάρτηση. Αναφορικά με τη διακοπή μακροχρόνιας θεραπείας με πρεγκαμπαλίνη, τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι η συχνότητα εμφάνισης και η βαρύτητα των στερεοτικών συμπτωμάτων μπορεί να είναι δόσοεξαρτώμενες. Συνιστάται η διακοπή της πρεγκαμπαλίνης να πραγματοποιηθεί βαθμιαία, σε διάστημα τουλάχιστον μιας εβδομάδας. Θα πρέπει να δίνεται προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό κατάχρησης ουσιών και οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για συμπτώματα ακατάλληλης χρήσης, κατάχρησης ή εξάρτησης από την πρεγκαμπαλίνη. Συνιστάται προσοχή κατά τη συνταγογράφηση πρεγκαμπαλίνης ταυτόχρονα με οπιοειδή, λόγω του κινδύνου καταστολής του ΚΝΕ. Όταν η πρεγκαμπαλίνη και οπιοειδή χορηγηθούν μαζί, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα κατά της δυσκοιλιότητας. Η πρεγκαμπαλίνη πιθανόν να ενισχύσει τη δράση της αιθανόλης και της λοραζεπάμης. Υπάρχουν αναφορές αναπνευστικής ανεπάρκειας και κώματος σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν πρεγκαμπαλίνη και άλλα φαρμακευτικά προϊόντα καταστολής του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η πρεγκαμπαλίνη φαίνεται ότι δρα αθροιστικά επί της δράσης της οξυμυκονόνης στην έκπτωση της νοητικής και της συνολικής κινητικής λειτουργίας. Ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στην γαλακτόζη, την έλλειψη λακτάσης Lapp ή την δυσασαροποίηση γλυκόζης-γαλακτόζης, δεν θα πρέπει να λαμβάνουν αυτό το φαρμακευτικό προϊόν. Σε ηλικιωμένους ασθενείς μπορεί να χρειαστεί μείωση της δόσης της πρεγκαμπαλίνης, λόγω μειωμένης νεφρικής λειτουργίας. Για τους ασθενείς που κάνουν αμοιωδίαση, η ημερήσια δόση της πρεγκαμπαλίνης πρέπει να προσαρμόζεται βάσει της νεφρικής λειτουργίας. Ορισμένοι διαβητικοί ασθενείς που παίρνουν βάρος κατά τη θεραπεία με πρεγκαμπαλίνη, μπορεί να χρειαστούν ρύθμιση των υπογλυκαιμικών τους φαρμακευτικών προϊόντων. Έχουν αναφερθεί σπάνια σοβαρές δερματικές ανεπιθύμητες ενέργειες (SCAR), στις οποίες περιλαμβάνονται το σύνδρομο Stevens-Johnson (SJS) και η τοξική επιδερμική νεκρόλυση (TEN), οι οποίες μπορεί να είναι απειλητικές για τη ζωή ή θάνατοφθορες. Κατά τη συνταγογράφηση σε ασθενείς θα πρέπει να σημειώνεται στενά με τα συμπτώματα και να παρακολουθούνται στενά για δερματικές αντιδράσεις. Σε περίπτωση εμφάνισης σημείων και συμπτωμάτων που υποδηλώνουν τέτοιες αντιδράσεις, η θεραπεία με πρεγκαμπαλίνη θα πρέπει να διακοπεί αμέσως και θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο χορήγησης εντακτικής θεραπείας (κατά περίπτωση). Η πρεγκαμπαλίνη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της κύησης, παρά μόνον εάν το όφελος για τη μητέρα είναι σαφώς μεγαλύτερο από τον δυνητικό κίνδυνο για το έμβρυο. Οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία πρέπει να χρησιμοποιούν αποτελεσματική αντισύλληψη κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Η πρεγκαμπαλίνη απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα. Θα πρέπει να συζητείται με τον γιατρό το ενδεχόμενο διακοπής του θηλασμού ή της θεραπείας.

Για το πλήρες κείμενο της δόσολογίας και του τρόπου χορήγησης συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Βιβλιογραφία: 1.Finnerup NB, Attal N, Haroutunian S, et al. pharmacotherapy for neuropathic pain in adults: a systematic review and meta-analysis. Lancet Neurol 2015;14(2):162-173. 2.NICE Clinical guideline. Last updated: 22 September 2020. Neuropathic pain in adults: pharmacological management in non-specialist settings. Available at <https://www.nice.org.uk/guidance/CG173>. Last accessed Nov 2024. 3.Schlereth T. Guideline "diagnosis and non-interventional therapy of neuropathic pain" of the German Society of Neurology (deutsche Gesellschaft für Neurologie). Neurol Res Pract 2020;2(1):16. 4.Moulin D, Boulanger A, Clark A, et al. Pharmacological management of chronic neuropathic pain: revised consensus statement from the Canadian Pain society. Pain Res Manag. 2014;19(6):328-335. 5.Rosenstock J, Tuchman M, LaMoreaux L, Sharma U. Pregabalin for the treatment of painful diabetic peripheral neuropathy: a double-blind, placebo-controlled trial. Pain. 2004;110(3):628-638. 6.Toelle T, Varvara R, Nimour M, et al. Pregabalin in neuropathic pain related to DPN, study, open pilot. 2012;5:1-11. 7.Zvan Seventer R, Feister HA, Young PJ, et al. Efficacy and tolerability of twice-daily pregabalin for treating pain and related sleep interference in postherpetic neuralgia: a 13-week, randomized trial. Curr Med Res Opin. 2006;22(2):375-384. 8.Siddall PJ, Cousins MJ, Otte A, et al. pregabalin in central neuropathic pain associated with spinal cord injury: a placebo-controlled trial. Neurology. 2006;67(11):1792-1800. 9.Montgomery SA. Pregabalin for the treatment of generalized anxiety disorder. Expert Opin Pharmacother. 2006;7(15):2139-2154. 10.Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Lyrica, 05/2024. 11.Serpell M, Laymer M, Almas M, et al. Neuropathic pain responds better to increased doses of pregabalin: an in-depth analysis of flexible-dose clinical trials. Pain Res. 2017; 10: 1769-1776.

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ - ΕΛΛΑΔΑ:

25/50 mg/cap x 56 caps: 3.50€, 50 mg/cap x 56 caps: 13,96€
75 mg/cap x 56 caps: 10,50€, 100 mg/cap x 21 caps: 7,75€
150 mg/cap x 56 caps: 15,51€, 300 mg/cap x 56 caps: 29,31€
Πόσιμο διάλυμα Φιάλη (473 ml): 52,51€

Τρόπος διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας τον κωδικό QR

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:

Viatrix Hellas Ltd, Α. Μεσογείων 253-255, Ν. Ψυχικό 154 51, Αθήνα, Ελλάδα, GR Α.Ε.ΜΗ 148421001000, Τηλ: (+30) 2100 100 002
GPA Pharmaceuticals Ltd, Βασιλείου Παύλου Α', 11, 1096 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ: +357 22863100

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ - ΚΥΠΡΟΣ:

25/50 mg/cap x 56 caps: 6,89€, 75 mg/cap x 56 caps: 14,19€
150 mg/cap x 56 caps: 21,07€, 300 mg/cap x 56 caps: 36,54€

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή

και αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ IASP & EFIC

Υπό την Αιγίδα



ΟΜΙΛΗΤΕΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Α

Αμανίτη Αικατερίνη

Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας /
Χρόνιου Πόνου, Τμήμα Ιατρικής,
Σχολή Επιστημών Υγείας,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Ανίσσoglou Σουζάνα

Πρόεδρος Επιστημονικού
Συμβουλίου και Υπεύθυνη
Διευθύντρια, Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας, Ιατρείο Πόνου &
Παρηγορικής Φροντίδας,
Αντικαρκινικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο»,
Μέλος Δ.Σ., Ελληνική Εταιρεία
Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής
Φροντίδας (ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α)

Αντωνοπούλου Ελπίδα

MD, EDRA, Συντονίστρια
Διευθύντρια, Αναισθησιολογικό
Τμήμα & Υπεύθυνη Ιατρείο Πόνου
Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, Ξάνθη

Αποστολάκη Στυλιανή

Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.,
Αναισθησιολογικό Τμήμα & Ιατρείο
Πόνου, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων,
Κρήτη

Αρναούτογλου Ελένη

Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας,
Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών
Υγείας, Διευθύντρια,
Αναισθησιολογική Κλινική,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Β

Βαγδατλή Κυριακή

Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.,
Υπεύθυνη Ιατρείου Πόνου, Γενικό
Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»,
Αθήνα

Βαλσαμίδης Δημήτριος

Διευθυντής - Επιστημονικός
Υπεύθυνος, Τμήμα Αναισθησιολογίας,
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«Αλεξάνδρα», Αθήνα

Βαρβέρη Μαριάνθη

Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια,
Αναισθησιολογικό Τμήμα & Υπεύθυνη
Ιατρείου Πόνου, Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου»,
Θεσσαλονίκη

Βεκράκου Άρτεμις

MD, DESAIC, PhD Επιμελήτρια Α'
Αναισθησιολογίας Γενικό
Νοσοκομείο Αθηνών «Π&Α Κυριακού»,
Αθήνα

Γ

Γαρίνη Ελεάνα

MSc, EDAIC, EDRA, Αναισθησιολόγος
Παιδών, Διευθύντρια,
Γενικό Νοσοκομείο
Παιδών «Η Αγία Σοφία», Πρόεδρος
Ελληνικής Αναισθησιολογικής
Εταιρείας, Αθήνα



ΟΜΙΛΗΤΕΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Δ

Διαμαντάκη Ελένη

Αναισθησιολόγος, Επιμελήτρια Α',
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Ηράκλειου, Κρήτη

Κ

Καρακώστα Αγάθη

Επίκουρη Καθηγήτρια
Αναισθησιολογίας, Τμήμα Ιατρικής,
Σχολή Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Κλινική
Αναισθησιολογίας και
Μετεγχειρητικής Εντατικής
Θεραπείας, Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων,
Ιωάννινα

Κετικίδου Ευγενία

Αναισθησιολόγος, Συντονίστρια
Διευθύντρια ΕΣΥ, Αναισθησιολογικό
Τμήμα & Ιατρείο Πόνου, Γενικό
Νοσοκομείο Καβάλας, Καβάλα

Κοκολάκη Μαρία

Αναισθησιολόγος, Διοικητικά και
Επιστημονικά Υπεύθυνη,
Αναισθησιολογικό Τμήμα & Ιατρείο
Πόνου, Γενικό Νοσοκομείο
«Σισμανόγλειο - Α. Φλέμιγκ» Αττικής,
Αθήνα

Κολοτούρα Αθηνά

Διοικητικά και Επιστημονικά
Υπεύθυνη, Αναισθησιολογικό Τμήμα
& Μονάδα Πόνου, Γενικό Νοσοκομείο
Ελευσίνας, «Θριάσιο», Αθήνα

Κοντούλη Ζηναΐς,

MD, MSc, PhD, FIP, Αναισθησιολόγος,
Επεμβατικό Ιατρείο, Ιατρικό Κέντρο
Αθηνών, Αθήνα

Κουρούκλη Ειρήνη

MD, PhD, FIPP, Διευθύντρια,
Αναισθησιολογικό Τμήμα & Ιατρείο
Πόνου, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«Ιπποκράτειο», Αθήνα

Μ

Μάλλιου Χρυσάνθη

Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.,
Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γενικό
Νοσοκομείο Μεσσηνίας, Νοσηλευτική
Μονάδα Καλαμάτας, Καλαμάτα

Μαντουβάλου Μαρία

MD, PhD, EDA, Αναισθησιολόγος,
Διευθύντρια, Αναισθησιολογικό
Τμήμα & Ιατρείο Πόνου,
Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά
«Άγιος Παντελεήμων», Αθήνα

Μίχα Γεωργία

MD, MSc, PhD, Επίκουρη Καθηγήτρια
Αναισθησιολογίας, Τμήμα Ιατρικής,
Σχολή Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Κλινική
Αναισθησιολογίας και
Μετεγχειρητικής Εντατικής
Θεραπείας, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Μπαϊρακτάρη Αγγελική

MD, MSc, PhD, DEAA, Συντονίστρια
Διευθύντρια, Αναισθησιολογικό
Τμήμα & Ιατρείο Πόνου, Γενικό
Νοσοκομείο Αττικής Κ.Α.Τ, Αθήνα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ IASP & EFIC

Υπό την Αιγίδα



ΟΜΙΛΗΤΕΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Μπαρέκα Μεταξία

Επίκουρη Καθηγήτρια
Αναισθησιολογίας, Τμήμα Ιατρικής,
Σχολή Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Λάρισας, Λάρισα

Μπαρκούρη Θεοδώρα

Αναισθησιολόγος, Επιμελήτρια Α',
Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, Σύρος

Μπουζιά Αικατερίνη

MD, PhD, Αναισθησιολόγος -
Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α',
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Λάρισας, Λάρισα

N

Νταλούκα Μαρία

Αναισθησιολόγος, Επιμελήτρια Β'
Ε.Σ.Υ., Αναισθησιολογική Κλινική,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Λάρισας, Ακαδημαϊκή Υπότροφος,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Νύκταρη Βασιλεία

MD, PhD, DEEA, Αναισθησιολόγος,
Επίκουρη Καθηγήτρια
Αναισθησιολογίας, Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Ηρακλείου,
Κρήτη

Π

Παπαγεωργίου Ειρήνη

Msc Αναισθησιολόγος -
Εντατικολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ
ΜΕΘ - Ιατρείο Πόνου και Παρηγορικής
Φροντίδας Θεαγένειο Αντικαρκινικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη

Σ

Σιαφάκα Βασιλική

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικής
Ψυχολογίας της Υγείας, Σχολή
Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Σιαφάκα Ιωάννα

Ομότιμη Καθηγήτρια
Αναισθησιολογίας και Θεραπείας
Πόνου, Ιατρική Σχολή, Εθνικό &
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Πρόεδρος, Ελληνικής
Εταιρείας Θεραπείας Πόνου &
Παρηγορικής Φροντίδας, Μέλος Δ.Σ.,
Ελληνικής Αντικαρκινικής
Εταιρείας, Αθήνα

Σταυροπούλου Ευμορφία

MD, PhD, EDRA, Αναισθησιολόγος,
Διευθύντρια, Αναισθησιολογικό
Τμήμα & Ιατρείο Πόνου, Γενικό
Νοσοκομείο Αττικής Κ.Α.Τ.,
Πρόεδρος Δ.Σ., ESRA HELLAS, Αθήνα

Στεφανάκης Γεώργιος

Αναισθησιολόγος, Επίκουρος
Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής,
Σχολή Επιστημών Υγείας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα



ΟΜΙΛΗΤΕΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Τ

Τσαρουχά Αθανασία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αναισθησιολογίας ΕΚΠΑ
Υπεύθυνη Ιατρείου Πόνου
και Παρηγορικής Αγωγής
Α' Αναισθησιολογική Κλινική
Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα

Τσιρογιάννη Αικατερίνη

Διευθύντρια, Αναισθησιολογικό
Τμήμα και Επιστημονικά Υπεύθυνη
Ιατρείου Πόνου, Γενικό Νοσοκομείο
Κατερίνης, Πιερία

Τσουμάνη Μαρία

Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος,
Επιμελήτρια Α' Αναισθησιολογικό
Τμήμα & Ιατρείο Πόνου, Γενικό
Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά
«Άγιος Παντελεήμων», Αθήνα

Φ

Φιλόπουλος Ευάγγελος

Πρόεδρος Ελληνικής
Αντικαρκινικής Εταιρείας,
τέως Διευθνής της Κλινικής Μαστού
του Νοσοκομείου «Ο Άγιος Σάββας»,
νυν Διευθυντής της Κλινικής Μαστού
της «Ευρωκλινικής Αθηνών», Αθήνα

Χ

Χλωροπούλου Παναγιώτα

Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.,
Αναισθησιολογικό Τμήμα & Ιατρείο
Πόνου, Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας,
Καβάλα

Χλωροπούλου - Βερέττα Πελαγία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αναισθησιολογίας, Σχολή Επιστημών
Υγείας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης, Διευθύντρια,
Πανεπιστημιακή Αναισθησιολογική
Κλινική & Ιατρείο Πόνου,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη

Χρονά Ελένη

Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια
Αναισθησιολογίας & Υπεύθυνη
Ιατρείου Πόνου, Γενικό Νοσοκομείο
Νίκαιας - Πειραιά «Αγ. Παντελεήμων»,
Αθήνα, Πρόεδρος Ελληνικής
Εταιρείας Αλγολογίας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ IASP & EFIC

Υπό την Αιγίδα



ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Σάββατο 31.05.2025

14:00 - 14:30

Δορυφορική Διάλεξη
της εταιρείας



**Πρωτόκολλο τιτλοποίησης ξηρού ανθού
κάνναβης σε ογκολογικούς ασθενείς.
Πιλοτική μελέτη**

Πρόεδρος: **Τσιρογιάννη Αικατερίνη**,
Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια Αναισθησιολογικού
& Επιστημονικά Υπεύθυνη Ιατρείου Πόνου,
Γ.Ν. Κατερίνης

Ομιλήτρια: **Κοντούλη Ζηναΐς**, MD, MSc, PhD, FIP,
Αναισθησιολόγος, Επεμβατικό Ιατρείο,
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

16^η

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Αλγολογίας
Καρκινικός Πόνος

31 Μαΐου & 1 Ιουνίου 2025
Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού
ΤΗΝΟΣ



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η Οργανωτική Επιτροπή της 16ης Επιστημονικής Συνάντησης Αλγολογίας ευχαριστεί θερμά τις παρακάτω εταιρείες για την υποστήριξή τους:



Spine Action



ΣΥΜΒΑΛΛΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ ΜΕ ΤΟ SHINGRIX¹

ΤΟ SHINGRIX ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ≥60 ΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ≥18 ΕΤΩΝ²

Σύντομη προφίλ ασφάλειας: Το SHINGRIX αντενδείκνυται σε οποιονδήποτε έχει υπερευαίσθηση στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Όπως συμβαίνει με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, η κατάλληλη ιατρική θεραπεία και επίβλεψη θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη σε περίπτωση αναφυλακτικού συμβάντος μετά τη χορήγηση του εμβολίου.

Σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν άλγος στη θέση ένεσης (68,1% συνολικά/δόση, 3,8% σοβαρού βαθμού/δόση), μυαλγία (32,9% συνολικά/δόση, 2,9% σοβαρού βαθμού/δόση), κόπωση (32,2% συνολικά/δόση, 3,0 % σοβαρού βαθμού/δόση) και κεφαλαλγία (26,3% συνολικά/δόση, 1,9% σοβαρού βαθμού/δόση). Οι περισσότερες από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες δεν ήταν μεγάλης διάρκειας (διάμεση διάρκεια 2 έως 3 ημέρες). Η διάρκεια των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν ως σοβαρές ήταν 1 έως 2 ημέρες. Σε ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών που έχουν ανοσοανεπάρκεια ή βρίσκονται σε ανοσοκατασταλή λόγω νόσου ή θεραπείας (αναφέρονται ως ανοσοκατεσταλμένοι (IC)), το προφίλ ασφάλειας ήταν σε συμφωνία με εκείνο που παρατηρήθηκε σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω. Υπάρχουν περιορισμένα δεδο-

μένα σε ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών με αυξημένο κίνδυνο ΗΖ που δεν είναι IC. Συνολικά, υπήρξε υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης κάποιων ανεπιθύμητων ενεργειών σε νεότερες ηλικιακές ομάδες:

- μελέτες σε IC ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών (συγκεντρωτική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης πόνου στο σημείο της ένεσης, κόπωσης, μυαλγίας, κεφαλαλγίας, ρίγους και πυρετού ήταν υψηλότερη σε ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 50 ετών και άνω.
- μελέτες σε ενήλικες ηλικίας ≥50 ετών (συγκεντρωτική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης μυαλγίας, κόπωσης, κεφαλαλγίας, ρίγους, πυρετού και γαστρεντερικών συμπτωμάτων ήταν υψηλότερη σε ενήλικες ηλικίας 50-69 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 70 ετών και άνω.

Δεν υπάρχουν δεδομένα από τη χρήση του SHINGRIX σε έγκυες γυναίκες. Ως προληπτικό μέτρο, είναι προτιμότερο να αποφευχθεί η χρήση του SHINGRIX κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Είναι άγνωστο εάν το SHINGRIX απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε εμβόλιο, ο εμβολιασμός με SHINGRIX μπορεί να μην έχει ως αποτέλεσμα την προστασία όλων των εμβολιασμένων.

Βιβλιογραφία: 1. SHINGRIX, Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Οκτώβριος 2023. 2. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού Ενηλίκων 2024.

Α.Τ.: 165,86 € % επιχορήγηση από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100% για τους πληθυσμούς που περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού Ενηλίκων. Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου/καταχώρησης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία για επιβεβαίωση πλήρους ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

PM-GR-SGX-ADVT-230002 | 03/2024 - 03/2026



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Για την

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρετε το QR code. Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρία. Το εμπορικό σήμα ανήκει ή έχει παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK. © 2024 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούπαρχος του Ομίλου GSK.



GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 6882100
www.gr.gsk.com



SHINGRIX
(ZOSTER VACCINE
RECOMBINANT, ADJUVANTED)